



Venta Libre

Industria Argentina

Comprimidos efervescentes

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO:

¿Qué contiene REDOXON®?

Cada comprimido efervescente sabor naranja con azúcar contiene: Como Ingrediente activo, 1000 miligramos de Vitamina C (Ácido Ascórbico) y como Ingredientes no activos: ácido tartárico, bicarbonato de sodio, riboflavina, sacarina sódica, cloruro de sodio, apocaroteno 1%, esencia de naranja, esencia de mandarina, azúcar.

¿Para qué se usa REDOXON®?

Redoxon ® está indicado para el tratamiento de estados carenciales de vitamina C.

¿Qué personas no puede recibir REDOXON®?

No use REDOXON® comprimidos efervescentes si usted:

- Es alérgico a algunos de los componentes activos del producto o sus excipientes.
- Tiene o ha tenido cálculos renales.
- Tiene insuficiencia renal severa o falla renal, incluyendo individuos en diálisis.
- Tiene enfermedad de los riñones como hiperoxaluria.
- Es menor de 16 años.
- Tiene enfermedades en las que el organismo absorbe mayor cantidad de hierro (Hemocromatosis- Talasemia).
- Tiene trastornos hereditarios de intolerancia a la fructosa.
- Tiene déficit de glucosa 6 fosfatasa.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar REDOXON®?

Tenga especial precaución y consulte con su médico antes de tomar este medicamento si usted:

- No exceda la dosis indicada.
- Tiene diabetes.
- Tiene insuficiencia renal.
- Debe realizarse un estudio de determinación de glucosa en orina.
- Debe realizarse un estudio para investigar la presencia de sangre oculta en la materia fecal.
- Los comprimidos efervescentes contienen sodio, esto debe ser tenido en cuenta por las personas que siguen una dieta baja en sodio.
- Si usted recibe algún otro medicamento, preparación vitamínica o multivitamina, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Cómo se usa REDOXON®?

Vía de administración oral.

Adultos y mayores de 16 años: 1000 mg por día. No superar la dosis recomendada. Usar por periodos cortos de tratamiento.

Forma de administración:

Disolver los comprimidos efervescentes en un vaso con 200 ml de agua.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando REDOXON®?

Pueden aparecer efectos no deseados como: diarrea, náuseas, vómitos y dolores gastrointestinales y abdominales. También pueden aparecer reacciones alérgicas o de hipersensibilidad que pueden afectar la piel, como erupciones cutáneas, urticaria, picazón, dificultad respiratoria, angiodema y síndrome de asma alérgica, etc. También podría aparecer reacciones anafilácticas o shock anafiláctico. Si esto sucede suspenda la medicación y consulte a su médico.

La vitamina C puede interferir en estudios de laboratorio, dando como resultado falsos valores. Se incluyen aquellos que requieren reacciones de óxido-reducción como por ejemplo mediciones de niveles de glucosa, creatinina, carbamazepina, ácido úrico, y fosfatos inorgánicos en orina, suero o sangre oculta en materia fecal. Consulte a su médico si toma este medicamento y planea realizarse dichos estudios.

¿En qué casos existen interacciones de otros medicamentos con REDOXON®?

Si usted está tomando anticonceptivos orales, corticoides, calcitonina, agentes salicilados, tetraciclinas, ácido acetilsalicílico, barbitúricos, flufenazina, warfarina, desferrioxamina, ciclosporina, disulfiram, indinavir, antiácidos que contienen aluminio, multivitamínicos con cianocobalamina y/o hierro consultar con un médico antes de utilizar este producto. La administración de ácido ascórbico, sobre todo en grandes dosis, podría favorecer o retrasar la eliminación o absorción de algunos medicamentos-

Interacciones con Alimentos

Hierro: La vitamina C puede aumentar la absorción de hierro.

¿Qué hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología.

En Uruguay: Llamar al CIAT Tel. (2) 1722

No utilice este medicamento luego de la fecha de vencimiento.

Conservación: Proteger de la humedad. Conservar a temperatura ambiente (inferior a 25°C).

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Presentaciones en Bolivia, Uruguay y Paraguay

Comprimidos efervescentes 1 g (sabor naranja) envase con 10

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar, por Bayer S.A., Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Buenos Aires, Argentina. Versión: CCDS 4

En Uruguay: Representado, importado y distribuido por Bayer S.A. R. L. N° 4, Luis A. de Herrera 1248 WTC Torre 3, Unidad 2074/2075 - Montevideo.

Reg. M.S.P. N° 21998

Dir. Téc.: Q.F. Verónica Rieger

Venta libre en condiciones reglamentarias.

Siga correctamente las instrucciones de uso y no desapareciendo los síntomas, consulte a su médico.

Servicio de información personalizada: 0800 2104

Fecha de última revisión: 15/06/2021

En Bolivia: Importado y distribuido por:

Bayer Boliviana Ltda.,

Av. Las Ramblas Edificio Tacural II Piso 2,

Centro Empresarial (Equipetrol Norte), Santa Cruz - Bolivia.

Q.F. Responsable: Susana Antezana

Reg. San. No. II-18118/2019

En caso de sobredosis acudir al centro de salud más cercano.

Condición de Venta: Venta Libre.

Representa y distribuye en **Paraguay**

Bayer S.A., Avda. Santa Teresa N° 2245

casi Avda. Aviadores del Chaco,

Asunción - Paraguay. Teléf. 617 3500

D.T.: Q.F. Verónica Patricia Acosta Ubaldi

Reg. Prof. 1.869

Venta autorizada por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

Registro sanitario N° 06267-05-EF

Cond. de venta: Libre en Farmacia.

En casos de sobredosis acudir al Centro Nacional

de Toxicología - Emergencias Médicas

Teléfono 204-800

